

Juvit Kids D3 krop.doust. 20000j.m. x 10ml krop.doust., roztw. 20 000 j.m./ml 10 ml (butelka)

Cena: 15,98 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Dawka | 20 000 j.m./ml |
| Opakowanie | 10 ml (butelka) |
| Postać | krop.doust., roztw. |
| Producent | PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Cholecalciferolum |

Opis produktu

Opis

JUVIT D3, 20 000 j.m./ml, krople doustne, roztwór. Skład: 1 ml (ok. 34 kropli) zawiera 0,5 mg Colecalciferolum (cholecalciferolu), co odpowiada 20 000 j.m. witaminy D3. 1 kropla zawiera ok. 0,015 mg Colecalciferolum (cholecalciferolu), co odpowiada ok. 590 j.m. witaminy D3. Postać farmaceutyczna: krople doustne, roztwór. Wskazania do stosowania: Zapobieganie krzywicy u dzieci. Zapobieganie schorzeniom, gdy stwierdzono ryzyko niedoboru witaminy D. Leczenie krzywicy i osteomalacji wywołanych niedoborem witaminy D. Dawkowanie i sposób podania: Zapobiegawczo: Niemowlęta od drugiego tygodnia życia do końca pierwszego roku życia: korzystające ze spacerów: 1 kropla (590 j.m.) na dobę; wcześniaki, bliźnięta i niemowlęta w złych warunkach życiowych: 1 do 2 kropli (590 j.m.-1180 j.m.) na dobę. Dzieci w drugim roku życia (zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych): 1 do 2 kropli (590 j.m.-1180 j.m.) na dobę. Dorośli: 1 do 2 kropli (590 j.m.-1180 j.m.) na dobę. Leczniczco: Krzywica i osteomalacja wywołana niedoborem witaminy D: 2 do 8 kropli (1180 j.m. do 4720 j.m.) na dobę przez cały rok. Niemowlętom i małym dzieciom produkt leczniczy można podawać w łyżce napoju lub pokarmu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalcemia. Kamica nerkowa. Sarkoidoza. Brak aktywności hydroksylazy cholecalciferolu w wątrobie i nerkach. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Jednoczesne przyjmowanie produktu leczniczego Juvit D3 z innymi produktami leczniczymi lub spożywczymi zawierającymi witaminę D (np. złożone preparaty witaminowo-mineralne) może prowadzić do przedawkowania. Podczas stosowania witaminy D3 przez długi okres lub w dawkach większych niż 1000 j.m. na dobę należy monitorować stężenie wapnia w surowicy. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów leczonych ciężkimi środkami moczopędnymi, a także w okresie ciąży. Działania niepożądane: Działania niepożądane nie występują przy podawaniu w zalecanych dawkach. Przyjmowanie witaminy D3 w większych dawkach powoduje hiperwitaminozę oraz hiperkalcemię i związane z tym objawy. Zaburzenia serca: uszkodzenie mięśnia sercowego. Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: utrata łaknienia, nudności, wymioty, biegunka. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: hiperkalcuria, uszkodzenie nerek, wielomocz. Zaburzenia ogóle i stany w miejscu podania: zwapnienie ektopowe, uczucie suchości w jamie ustnej. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 10478. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza - Rp. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu.

