

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry 15 g

Cena: 7,98 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 0,2 g/g |
| Opakowanie | 15 g |
| Postać | - |
| Producent | ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Acid.salicylic. |

Opis produktu

Informacje o produkcie

ZASTOSOWANIE

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” jest przeznaczona do stosowania miejscowego. Lek zawiera substancję czynną kwas salicylowy, który stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek działa złuszcząco, zmiękcza i rozpuszcza naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.

WSKAZANIA

Usuwanie odcisków oraz zgrubień skóry.

DZIAŁANIE

Złuszczące, zmiękczące i rozpuszczające naskórek, ułatwiające jego złuszczenie.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest kwas salicylowy.
1 g maści zawiera 200 mg kwasu salicylowego.
Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: wazelina żółta.

SPOSÓB UŻYCIA

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przed rozpoczęciem leczenia nogi należy dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie. Następnie należy nałożyć maść na odcisk i zabezpieczyć plastrem. Należy codziennie uzupełniać ubytek maści zachowując ostrożność tak, aby nie dostała się na zdrową skórę. Leczenie trwa tydzień. Po upływie tego czasu nogi należy ponownie dobrze wymoczyć. Odcisk powinien dać się łatwo usunąć. W ten sam sposób leczy się zgrubiałą skórę.
W przypadku bardzo zastarzałych zmian, leczenie należy powtórzyć. Nie stosować leku dłużej niż przez 2 tygodnie.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie stosować leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;
- jeśli skóra w okolicy odcisku (lub zgrubienia skóry) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;
- na zmiany o dużej powierzchni;
- do oczu;
- na skórę twarzy, pachwin;
- w okolicy odbytu i narządów płciowych;
- na błony śluzowe;
- u dzieci.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować miejscowe podrażnienie skóry, stan zapalny skóry, odczyny alergiczne i nadmierne wysuszenie skóry.

Zastosowanie leku na skórę zdrową, duże powierzchnie skóry lub błony śluzowe może powodować objawy podrażnienia w postaci rumienia. W przypadku przewlekłego stosowania leku mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu salicylowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym

lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

OSTRZEŻENIA

Przed rozpoczęciem stosowania Maści przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Łuszczy należy to omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy przerwać leczenie, jeśli nastąpi nadmierne podrażnienie skóry.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zgrubienie skóry – nie należy stosować leku na niezmienną zdrową skórę ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić jego ogólnoustrojowe działania. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy ją natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować u dzieci.

Lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Łuszczy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami

Ponieważ kwas salicylowy wchłania się przez nieuszkodzony naskórek, lek może oddziaływać z preparatami działającymi ogólnie i miejscowo. Kwas salicylowy nasila działanie m.in. doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika, preparatów litu, leków przeciwzakrzepowych, może też nasilać działanie fenytoiny i kwasu walproinowego. Leki metabolizowane przez cytochrom P-450, jak cymetydyna, hamują metabolizm kwasu salicylowego. Kwas salicylowy może osłabiać działanie leków zmniejszających ciśnienie krwi, np. z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz leków moczopędnych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

ZAWARTOŚĆ NETTO

15 g

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

maść

REJESTRACJA
Produkt leczniczy

NUMER POZWOLENIA
R/1452

DODATKOWE INFORMACJE:
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Składniki

1 g maści zawiera substancję czynną: kwas salicylowy 200 mg, substancja pomocnicza: wazelina żółta

Dawkowanie

Sposób i droga podania: Podanie na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 2 lata.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1452
Lek na receptę: Nie

Producent

Podmiot odpowiedzialny:
Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5,
30-851 Kraków