

Nurofen dla dzieci Forte Zawiesina doustna o smaku truskawkowym 150 ml



Cena: 44,98 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Opakowanie	150 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Informacje o produkcie

40 mg/ml, Ibuprofenum

Dla dzieci o masie ciała od 5 kg (3 miesiące) do 40 kg (12 lat)

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Do krótkotrwałego, objawowego leczenia:

- bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz
- gorączki

Składniki

Każdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu, Zawiera maltitol ciekły i sól, W celu uzyskania dalszych informacji, patrz ulotka dla pacjenta

Dawkowanie

Podanie doustne.

Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 3. miesiąca życia lub o masie ciała poniżej 5 kg.

Zazwyczaj stosowana dawka w przypadku bólu lub gorączki, to:

Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 5 kg (3 do 5 miesięcy) / Jaka ilość? 1,25 ml / Jak często w ciągu 24 godzin?* 3 razy

Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 7 do 9 kg (6 do 11 miesięcy) / Jaka ilość? 1,25 ml / Jak często w ciągu 24 godzin?* 3 do 4 razy

Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 10 do 15 kg (1 do 3 lat) / Jaka ilość? 2,5 ml / Jak często w ciągu 24 godzin?* 3 razy
Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 16 do 19 kg (4 do 5 lat) / Jaka ilość? 3,75 ml / Jak często w ciągu 24 godzin?* 3 razy
Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 20 do 29 kg (6 do 9 lat) / Jaka ilość? 5 ml / Jak często w ciągu 24 godzin?* 3 razy
Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 30 do 40 kg (10 do 12 lat) / Jaka ilość? 7,5 ml (dwukrotne użycie strzykawki: 5 ml + 2,5 ml) / Jak często w ciągu 24 godzin?* 3 razy
*Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się lub utrzymują:

- w ciągu 24 godzin u niemowląt w wieku 3 - 5 miesięcy
- w ciągu 3 dni u dzieci w wieku 6 miesięcy do 12 lat.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Przeciwwskazania

UWAGA: nie przekraczać zalecanej dawki.

LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Pozwolenie/rodzaj towaru

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22449

Lek na receptę: Nie

Producent

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki