

Pedicetamol (Apiredol) rozt. 0,1g/1m x 30



Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	rozt.doust.
Producent	POLSKI LEK DYSTRYBUCJA
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamolium

Opis produktu

Informacje o produkcie

W postaci kropli lub roztworu doustnego.
(Paracetamol, 100 mg/ml).
Dla niemowląt od 0 miesięcy i dzieci.

Pedicetamol® zawiera paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Lek jest stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzania bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, gorączka nie ustąpi po 3 dniach lub jeśli ból nie ustąpi po 3 dniach u dzieci lub 5 dniach u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła), należy zwrócić się do lekarza.

Jedyny od pierwszych dni życia w dawce 100 mg/ml.

75% mniej płynu do połknięcia dla dziecka w porównaniu do innych paracetamoli dla dzieci dostępnych na rynku w stężeniu 24 mg/ml. Skoncentrowana dawka leku oznacza dla Twojego dziecka mniej płynu do połknięcia, a dla Ciebie łatwiejszą podaż leku za pomocą wygodnego kroplomierza z podziałka.

Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek Dystrybucja Sp. z o.o.

Składniki

Substancją czynną leku jest paracetamol.
1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.

Nie stosować w przypadku uczulenia na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Inne składniki leku to: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzyłowy), sacharyna sodowa, azorubina (E122).

Dawkowanie

Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w mililitrach (ml) roztworu doustnego. Dawkowanie co 6 godzin w mililitrach (ml):

U dzieci w wieku poniżej 3 lat zaleca się podawanie roztworu za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml.

U dzieci w wieku od 3 lat zaleca się podawanie roztworu za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania 60 ml.

Jeżeli pożądanego działania nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku odpowiednią dawkę należy wyliczyć zgodnie z poniższą instrukcją:

masa ciała dziecka w kilogramach (kg) \times 0,1 \times dawka leku Pedicetamol® w mililitrach (ml)

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

Ostrzeżenia

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.