

Trilac Plus Supplement diety 11,85 g (30 sztuk)

Cena: 37,98 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 kaps.
Postać	kaps.twarde
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	-

Opis produktu

Informacje o produkcie

ZASTOSOWANIE

trilac® plus to probiotyk zawierający 4 szczepy bakterii probiotycznych zamkniętych w kapsułkach DRCaps™, które dzięki zastosowanej technologii opóźnionego uwalniania rozpuszczają się dopiero w jelitach. Technologia DRCaps™ pozwala na zabezpieczenie bakterii przed działaniem soku żołądkowego.

WSKAZANIA

trilac® plus to produkt przeznaczony dla niemowląt powyżej 1. miesiąca życia, dzieci i dorosłych, w celu uzupełnienia mikroflory jelitowej. Zawiera kompozycję składającą się z czterech wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych: Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), mieszanka szczepów Bifidobacterium lactis (BLC1), Lactobacillus acidophilus (LA3), Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (SP96).

DZIAŁANIE

Przywrócenie i utrzymanie homeostazy przewodu pokarmowego metabolity bakterii kwasu mlekowego tworzą odpowiednie środowisko do wzrostu prawidłowej flory jelitowej, a tym samym zapobiegają kolonizacji drobnoustrojów chorobotwórczych.

SKŁAD

trilac® plus zawiera kompozycję składającą się z 4 wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych:

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 1,6x10⁹ CFU* w 1 kapsułce,

Bifidobacterium animalis lactis BLC1 0,76x10⁹ CFU* w 1 kapsułce,

Lactobacillus acidophilus LA3 0,74x10⁹ CFU* w 1 kapsułce,

Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus SP96 0,1 x10⁹ CFU* w 1 kapsułce.

trilac® plus został wzbogacony prebiotykiem - inuliną, która stanowi pożywkę umożliwiającą prawidłowe namnażanie się bakterii probiotycznych w jelitach.

*CFU (ang. colony forming unit) – jednostka tworząca kolonię.

SPOSÓB UŻYCIA

1 kapsułka. Najlepiej spożywać z dużą ilością płynu, podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem.

W przypadku podawania probiotyku małym dzieciom lub osobom mającym trudności z połykaniem, zawartość kapsułki należy wysypać na łyżeczkę i wymieszać w niewielkiej ilości letniej przegotowanej wody, mleka lub jogurtu, następnie spożyć. W czasie antybiotykoterapii przyjmować co najmniej 2 godziny po zażyciu antybiotyku.

Zaleca się stosowanie trilac® plus, do 3 tygodni od zakończonej kuracji antybiotykowej.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono.

OSTRZEŻENIA

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

ZAWARTOŚĆ NETTO

30 kapsułek

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki

REJESTRACJA

Suplement diety

NUMER POZWOLENIA

2022/06/03/SD/AAC40F

DODATKOWE INFORMACJE

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej, 15-25°C.

Składniki

inulina, hydroksypropylometyloceluloza E464, liofilizowane szczepy: Lacticaseibacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Bifidobacterium animalis lactis BLC1, Lactobacillus acidophilus LA3, Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus SP96, substancja zagęszczająca: guma gellan E418, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych E470b, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu E551, barwnik kapsułki: tlenki i wodorotlenki żelaza E172

Dawkowanie

zalecane dzienne spożycie: 1 kapsułka dziennie. Najlepiej spożywać z dużą ilością płynu, podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem.

W przypadku podawania probiotyku małym dzieciom lub osobom mającym trudności z połykaniem, zawartość kapsułki należy wysypać na łyżeczkę i wymieszać w niewielkiej ilości letniej przegotowanej wody, mleka lub jogurtu, następnie spożyć. W czasie antybiotykoterapii przyjmować co najmniej 2 godziny po zażyciu antybiotyku. Zaleca się stosowanie trilac plus, do 3 tygodni od zakończonej kuracji antybiotykowej.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze 15-25°C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Nie wymaga przechowywania w lodówce. Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania

ważne informacje: suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

W okresie ciąży i karmienia piersią, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Producent

Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5,
30-851 Kraków