

# Venożel żel x 100 g

Cena: 35,98 pln



## Opis słownikowy

Dawka	(0,012g+0,01g+5mg)/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
Rejestracja	
Substancja czynna	Diclofenacum natricum, Tribenosidum, Escin

## Opis produktu

### Opis

Venożel, żel o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym, 100 g

Rodzaj rejestracji: lek OTC / lek dostępny bez recepty

Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited

Postać: żel

Wielkość opakowania: 100 g

Zalecane kategorie:

Żyłki i obrzęki

Maści, żele przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe

EAN: 5909990724406

BLOZ: 6133812

Rekomendacja dla apteki - słowa kluczowe do wyszukiwarki sklepowej: żel na żyłki, żel na żyłki nóg, żel na obrzęki, na obrzęki pourazowe, na obrzęki zastoinowe, na obrzęki pooperacyjne, żel przeciwobrzękowy, na ból i obrzęki nóg, lek na stan zapalny żył nóg, żel na ból i obrzęki nóg, żel przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy

Krótki opis (np. na stronie kategorii):

Venożel to lek stosowany przy obrzękach, bólu i stanie zapalnym żył nóg. Wskazany także w pourazowych bólach mięśni i stawów. Jest to żel o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Opis produktu / Wskazania i działanie:

Venożel jest lekiem, zawierającym aż 3 substancje czynne: diklofenak, trybenozyd i escynę. Dzięki temu, po podaniu na skórę, działa silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Escyna wykazuje działanie przeciwobrzękowe i uszczelniające śródbłonek naczyń krwionośnych. Venożel to idealny lek dla osób cierpiących na obrzęki i bóle nóg, zapalenie żył kończyn dolnych, jak również obrzęki pooperacyjne. Żel przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy należy delikatnie wmasować w miejsca zmienione chorobowo.

- Venożel ma szerokie spektrum działania dzięki zawartości aż 3 substancji czynnych.
- Potrójny mechanizm działania: przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy.
- Przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12-ego roku życia.

Wskazania do stosowania leku Venożel:

- zapalenia żył kończyn dolnych,
- obrzęki pooperacyjne i pourazowe, obrzęki zastoinowe kończyn dolnych,
- zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa,
- pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania),
- ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów.

Skład – co zawiera lek Venożel:

1 g żelu zawiera 12 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacumnatricum), 10 mg trybenozydu (Tribenosidum), 5 mg escyny (Escinum) i substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek i wodę oczyszczoną.

Dawkowanie – jak stosować lek Venożel:

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Venożel należy stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować pasek żelu o długości około 4 cm. Po nałożeniu żel należy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zmian chorobowych oraz od reakcji na leczenie. Zwykle leczenie trwa nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). W przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych, zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu.

Kiedy nie stosować leku Venożel:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku,
- w przypadku uszkodzeń, zmian zapalnych skóry oraz otwartych ran,
- w ostatnich trzech miesiącach ciąży i w okresie karmienia piersią,
- przy występowaniu napadów astmy, pokrzywki lub ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Lek Venożel a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas prawidłowego stosowania, wystąpienie interakcji substancji czynnych leku z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

Venożel można stosować jednocześnie z innymi postaciami farmaceutycznymi diklofenaku, trybenozydu i escyny (tabletki, czopki itp.). Jednakże w przypadku długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry nie można całkowicie wykluczyć oddziaływania składników leku Venożel z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania długotrwale i na dużą powierzchnię skóry.

Nie należy stosować leku Venożel:

- na błony śluzowe oraz do oczu; w razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć, obficie splukując wodą,
- pod opatrunki (bandaże, plastry),
- doustnie.

W okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W trzecim trymestrze ciąży stosowanie leku Venożel jest przeciwwskazane.

Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych, nie zaleca się stosowania leku Venożel podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży.

W tych przypadkach Venożel można stosować jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść z zastosowania leku u matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Venożel u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Venożelnie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd, wysypka, reakcje nadwrażliwości na światło, obrzęk), które przemijają po zaprzestaniu stosowania leku.

W przypadku długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry, mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania diklofenaku (np. nudności, biegunka, bóle brzucha, bóle głowy, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, wysypka grudkowata). Częstość występowania tych reakcji jest nieznana. W takich przypadkach należy powiadomić lekarza.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny / Wytwórca:

Bausch Health Ireland Limited  
3013 Lake Drive  
Citywest Business Campus  
Dublin 24, D24PPT3  
Irlandia

Klauzula, jeśli apteka nie dodaje jej automatycznie:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.