

Verbascon Gardło Med Pastyłki do ssania smak pomarańczowo-grejpfrutowy 24 sztuki

Cena: 16,98 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 24 pastyl. |
| Postać | pastyl.do ssania |
| Producent | POLSKI LEK |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Informacje o produkcie

Wskazania do stosowania:

- Łagodzenie stanu zapalnego gardła, bólu gardła i chrypki,
- Łagodzenie objawów związanych z suchym kaszlem, odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle
- Ułatwienie swobodnego oddychania - kompleks inhalujących olejków.

Verbascon gardło med zawierający kompleks składników Propocell zalecany jest do stosowania przy infekcjach górnych dróg oddechowych, grypie, przeziębieniach, którym towarzyszy ból gardła, bądź chrypa. Polecany jest również osobom pracującym głosem lub narażonym na długotrwałe przebywanie w suchych, zapyłonych, zadymionych lub ogrzewanych pomieszczeniach.

Składniki

gęsty ekstrakt z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis* L.) DER 3-4:1, ekstrakt z propolisu, mentol, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy, Pozostałe składniki: substancja słodząca: izomalt, aromat grejpfruta czerwonego, olejek z pomarańczy brazylijskiej, substancje słodzące: glikozydy stewiolowe, sukraloza

Wartości odżywcze

| | Zawartość substancji aktywnych 1 pastylka |
|---|---|
| Ekstrakt z propolisu | 33 mg |
| Ekstrakt z korzenia prawoślazu (<i>Althaea officinalis</i> L.) DER 3-4:1 | 35 mg |
| Olejek miętowy (<i>Mentha arvensis</i> L.) | 2,5 mg |
| Olejek eukaliptusowy (<i>Eucalyptus Globulus</i> Labill.) | 3 mg |
| Mentol | 3,5 mg |

Dawkowanie

Dawkowanie: Dzieci powyżej 6 roku życia oraz osoby dorosłe. Ssać powoli 1 pastylkę w zależności od potrzeb 3-5 razy dziennie.

Przechowywanie

Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik wymieniony w wykazie składników. Nie stosować po upływie terminu ważności. Stosować zgodnie z instrukcją użycia. Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie. W przypadku braku poprawy bądź nasilenia objawów po tygodniu należy zasięgnąć porady lekarza. Brak danych dotyczących stosowania niniejszego wyrobu medycznego przez kobiety w okresie ciąży i laktacji. Przed zastosowaniem należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia ze względu na ryzyko zachłyśnięcia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Producent

"POLSKI LEK" Sp. z o.o.
ul. Chopina 10,
34-100 Wadowice
Polska