

# Voltaren Max 23,2 mg/g Lek przeciwbólowy przeciwzapalny i przeciwobrzękowy 180 g

Cena: 69,98 pln



## Opis słownikowy

Dawka	0,0232 g/g
Opakowanie	180 g (tuba)
Postać	żel
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Diclofenacum

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

Voltaren MAX żel to produkt leczniczy, który zawiera substancję czynną diklofenak dietyloamoniowy, należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa potrójnie: przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo. Żel jest stosowany do miejscowego leczenia bólu i stanów zapalnych, takich jak zapalenie stawów, ból mięśni i ścięgien, ból pleców, ból pourazowy oraz ból pourazowy spowodowany skręceniami i zwichnięciami. Voltaren Max to silne rozwiązanie bez obciążania żołądka, przynosi ulgę w bólu dwa razy szybciej.\* Diklofenak działa poprzez hamowanie produkcji prostaglandyn, które są związane z procesem zapalnym, co przyczynia się do zmniejszenia bólu i obrzęku. Produkt jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia. Żel należy wcierać w skórę w miejscu bólu i pozostawić do wchłonięcia. Zapomnij o bólu na cały dzień i całą noc! **Voltaren MAX stosowany rano i wieczorem działa do 24h.**

\*w testach laboratoryjnych  
**działanie przeciwbólowe do 24h przy aplikacji żelu co 12 godzin**

### Składniki

100 g leku zawiera 2,32 g substancji czynnej - diklofenaku dietyloamoniowego oraz substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokocylokaprylokapronian, parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa (z alkoholem benzylovym, cytronellolem, kumaryną, d-limonenem, eugenolem, geraniolem, linalolem), butylohydroksytoluen (E 321), woda oczyszczona

### Dawkowanie

Sposób stosowania:

Voltaren Max należy stosować na powierzchnię skóry w miejscu bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie, 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie na skórę.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C

**Przeciwwskazania**

Nie należy stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na diklofenak, kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Pozwolenie/rodzaj towaru**

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20030

Lek na receptę: Nie

**Producent**

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

## Galeria

---

