

Zovirax Duo 50 mg + 10 mg Krem 2 g

Cena: 34,98 pln



Opis słownikowy

Dawka	(0,05g+0,01g)/g
Opakowanie	2 g (tuba)
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Aciclovirum, Hydrocortisonum

Opis produktu

Informacje o produkcie

Czujesz mrowienie, swędzenie, zaczerwienienie i już wiesz, że za moment na Twoich ustach znów pojawi się opryszczka, której trudno się pozbyć? Poznaj Zovirax Duo – krem przeciwwirusowy na opryszczkę, o działaniu przeciwwirusowym, który pomaga leczyć wczesne objawy nawracającej opryszczki wargowej i zmniejsza prawdopodobieństwo jej ponownego wystąpienia. Zovirax Duo zawiera dwie substancje czynne w swoim składzie, dzięki którym działa na dwa różne sposoby. Acyklowir hamuje wzrost wirusa odpowiedzialnego za opryszczkę, a hydrokortyzon ułatwia leczenie stanu zapalnego, który jej towarzyszy. Zastosowany odpowiednio wcześniej pomaga zapobiegać pojawieniu się opryszczki, a jeśli już się rozwinęła, stosowanie kremu skraca czas gojenia zmian*. Przekonaj się, jak działa Zovirax Duo i przestań się martwić opryszczką!

*skraca czas gojenia zmian o około pół do jednego dnia w porównaniu do kremu niezawierającego substancji czynnych

Składniki

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu. Inne składniki leku to: parafina ciekła, wazelina biała, izopropylu mirystynian, sodu laurylosiarczan, alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona

Dawkowanie

Nakładać lek 5 razy na dobę przez 5 dni (co 3-4 godziny w ciągu dnia). Zaleca się rozpoczęcie leczenia jak najwcześniej, najlepiej po wystąpieniu pierwszych objawów opryszczki warg (takich, jak mrowienie, zaczerwienienie lub swędzenie).

Podanie na skórę.

Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Po użyciu należy umyć ręce.
Nie stosować do oczu, wewnątrz jamy ustnej i nosa.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przechowywanie

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16798

Lek na receptę: Nie

Producent

Podmiot odpowiedzialny:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189,
60-322 Poznań

Galeria

